

LIITTEET

LIITE 1

Oikeiden vastausten osuus tietotestissä 2000 ja 2006				
Väittämä	Työt		Pojat	
	2000	2006	2000	2006
1. Murrosiän fyysiset muutokset tapahtuvat teini-ikäisille eri ikäisinä	75,9	78,6	65,9	75,3
2. Seksuaaliasiat alkavat kiinnostaa murrosikäisiä enemmän, koska heidän hormonituotantonsa muuttuu, joillakin heidän ystävästään on seksikokeuksia ja koska media tyrkyttää seksiä teini-ikäisille	34,1	44,0	32,7	32,0
3. Peniksen päässä sijaitsevaa terskaa peittää esinahka. Suositeltavaa hygienian kannalta on vetää esinahka aivan taakse ja pestä penis kokonaan	66,1	64,9	71,9	74,7
4. Miehen sukupuolielimiin kuuluvat penis, kivekset ja eturauhanen	35,3	38,4	35,3	38,7
5. Naisen sukupuolielimiin kuuluvat kaksi munasarjaa, kaksi munanjohdinta ja kohtu	48,3	49,4	30,9	34,9
6. Sekä munasarjat että kivekset tuottavat hormoneja	65,2	71,5	47,2	60,3
7. Siittiöitä tuotetaan kiveksissä	66,5	69,2	76,2	79,2
8. Miehen kivekset tuottavat miljoonia siittiöitä jokaiseen siemensyöksyyn	81,5	83,7	80,0	83,3
9. Pojat yölliset siemensyöksyt (märät unet) tarkoittavat, että hän on kokemassa normaalia aikuiseksi kehittymisen vaihetta	95,8	95,2	89,6	91,3
10. Paikkansapitämätön väite: Murrosiässä poikien hormonieritys saa kuukausirytmien	87,7	88,6	86,5	88,4
11. Masturbointi tarkoittaa itsensä seksuaalisesti kiihottavaa hyväilemistä	94,3	94,1	89,5	91,9
12. Poikien penis kovettuu ajoittain. Sellaista voi tapahtua kun poika koskettelee sukupuolielimiään, tanssiessa ja silloin, kun poika katselee ihailien tyttöjä	79,3	81,7	70,8	77,0

Oikeiden vastausten osuus tietotestissä 2000 ja 2006

Väittäjä	Tytöt		Pojat	
	2000	2006	2000	2006
13. Kuukautiskierto tarkoittaa aikaa kuukautisten alusta seuraavien kuukautisten alkuun	92,7	90,8	71,0	73,6
14. Kuukautisten aina tytöt EIVÄT tule herkemmin raskaaksi, koe keskenmenoä tai ole liian heikkoja osallistumaan urheiluharjoituksiin	73,3	72,2	45,0	50,3
15. Tyttöjen emättimessä sijaitseva immenkalvo on emättimen suulla oleva limakalvopoimu, jonka koko ja muoto vaihtelevat suuresti eri tytöillä	36,6	36,0	23,4	32,7
16. Tyttöjen rinnat kehittyvät suuremmiksi murrosiässä. Ne ovat usein vähän eri kokoiset vielä kehittyessään, ovat vähän arat ennen kuukautisia ja alkavat kehittyä normaalisti 8–13 vuoden iässä	81,4	83,9	53,1	61,6
17. Rintojen koko on yhteydessä tytön perimään ruumiinrakenteeseen	94,9	94,1	73,1	80,8
18. Klitoris on tuntoherkkä kohouma häpyhuulien yläpuolella	75,0	80,0	65,2	73,9
19. Valkovuoto on normaalia, kehitykseen kuuluvaa eritettä, jonka tulo alkaa yleensä jo ennen kuukautisten alkua	97,1	96,8	62,5	62,9
20. Valkovuotoa esiintyy yleensä kaikilla tytöillä jossakin määrin, yleensä erilaatuisena ja eri määriä kuukautiskierron eri päivinä ja erityisen paljon tytön ollessa seksuaalisesti kiihottunut	60,6	61,6	21,2	26,2
21. Peniksen päästä purskahtava vaalea, limamainen neste on siemennestettä	93,7	95,8	89,9	93,2
22. Mistä tietää, että tyttö voi tulla raskaaksi? Siitä, että hänen kuukautisensa ovat alkaneet	95,4	95,4	82,6	87,3
23. Kaikki eivät tule halutessaan raskaaksi, vaikka yrittäisivät kuinka kauan	85,6	84,9	75,0	74,3
24. Nainen tulee helpoimmin raskaaksi kuukautiskierron puolivälissä	47,8	48,9	24,6	25,7
25. Nainen ei voi tulla raskaaksi suuseksissä	95,8	95,5	92,3	93,2
26. Naisen mahdollisuutta tulla raskaaksi parantaa, jos yhdyntä tapahtuu sopivassa kohtaa kuukautiskiertoa	83,5	84,4	57,2	65,8

Oikeiden vastausten osuus tietotestissä 2000 ja 2006				
Väittäjä	Työt		Pojat	
	2000	2006	2000	2006
27. Nainen EI VOI tunnistaa tullessa raskaaksi, kun hän voi pahoin seuraavina päivinä yhdynnän jälkeen, kun emättimestä tulee outoa vuotoa tai kun paino nousee viikon kuluttua yhdynnästä	67,6	67,1	45,0	49,7
28. Nuorten raskauden- ja sukupuolitautien ehkäisy on yhteisesti sekä tytön että pojan vastuulla	97,5	96,8	90,6	90,2
29. Ehkäisykeinoa valittaessa tulisi ottaa selvää kaikista menetelmistä ja valita itselleen parhaiten sopiva	96,8	96,7	88,7	90,2
30. E-pillerit ehkäisee varmimmin raskauden	44,8	45,0	24,0	23,0
31. Keskeytetty yhdyntä on epäluotettavin keino ehkäistä raskaus	91,2	90,1	77,9	81,0
32. Kondomi ehkäisee siten, että siittiöt jäävät siemensyöksyn jälkeen kondomin sisälle	90,4	91,8	88,5	91,1
33. Kondomia käytettäessä on väärin asettaa kondomi paikoilleen juuri ennen siemensyöksyä	80,3	80,5	81,3	85,0
34. Kondomeja voi ostaa vapaasti apteekeista, ruokakaupoista, kioskeista ja huoltoasemilta	98,5	98,2	94,8	94,6
35. Kondomien ostamisessa ei ole ikärajaa	94,1	91,0	82,4	85,8
36. Viiden kappaleen pakkaus tavallisia kondomeja maksaa ruokakaupassa keskimäärin 4 euroa	76,8	58,5	73,4	61,2
37. Jos haluaa e-pilleriehkäisyn tulee ottaa yhteyttä koulu-terveydenhoitajaan, lääkäriin tai ehkäisyneuvolaan	86,3	86,6	72,5	73,3
38. E-pillerit ehkäisevät raskauden estämällä munasolun kypsymisen	53,9	64,5	48,0	54,0
39. Ehkäisytabletteja otetaan yhtäjaksoisesti 21-22 päivää, jotta ne olisivat tehokkaita	86,1	86,4	66,9	69,0
40. Ehkäisytablettien terveysvaikutuksena on kuukautiskipujen lieveneminen, kuukautiskierron säännöllistyminen ja verenhukan väheneminen kuukautisten aikana	51,0	56,7	41,1	41,4
41. Jälkiehkäisy aloitetaan niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään 72 tuntia suojaamattomasta yhdynnästä	80,6	84,8	63,7	72,4
42. Jos epäilee olevansa ei-toivotusti raskaana tulee tehdä raskaustesti	93,4	93,6	86,5	87,6

Oikeiden vastausten osuus tietotestissä 2000 ja 2006				
Väittäjä	Tytöt		Pojat	
	2000	2006	2000	2006
43. Alkaneen raskauden jatkamisesta päättää ensisijaisesti tyttö	81,3	76,7	61,5	63,1
44. Kun alle 16-vuotias tyttö Suomessa huomaa olevansa raskaana, hän useimmiten tekee abortin	88,0	85,5	79,0	77,8
45. Suomessa suoritettu raskauden keskeytys ei vaikuta kykyyn tulla myöhemmin raskaaksi	71,4	66,3	63,3	62,4
46. Joskus ehkäisy voi unohtua, koska ei olla varauduttu yhdyntään. Tämän voi välttää kuljettamalla itse aina mukana kondomeja	92,1	87,7	84,4	83,4
47. Sukupuolitaudit tarttuvat limakalvokontakteissa limakalvolta toiselle	86,1	84,2	77,1	80,5
48. EI VOI TIETÄÄ, että yhdyntäkumppanilta ei saa sukupuolitauteja, kun on tuntenut hänet jo usean kuukauden ajan, kun hänellä on kavereiden piirissä hyvä maine tai kun hän kertoo, että hänellä ei ole sukupuolitauteja	81,1	80,5	70,3	73,9
49. Kondomi on paras ehkäisyväline niille, joiden kumppani vaihtuu	93,9	89,3	86,7	84,7
50. Sukupuolitauditartunnan voi tutkituttaa ja saada sille hoitoa koululääkärin vastaanotolla, terveyskeskuksessa ja sukupuolitauteiden poliklinikalla	41,6	46,5	33,3	39,6
51. Sukupuolitautien hoito onnistuu parhaiten kun molemmat kumppanit hoidetaan samaan aikaan	44,7	43,6	33,1	36,8
52. Herpestä ei voi täysin parantaa	34,1	37,1	18,7	28,4
53. Kondylooma eli visvasyyliä on sukupuoliteitse tarttuva tauti, joka tekee joskus syylämäisiä muutoksia limakalvolle tai iholle	47,2	50,7	45,4	44,9
54. Sukupuolitauditartunta voi USEIN olla täysin oireeton	25,0	36,2	18,7	26,0
55. Klamydia on sukupuolitauti	89,8	93,4	78,5	85,1
56. Väärä väite: Masturbointi on vaarallista terveydelle	77,0	77,0	60,8	65,9
57. Itsetyydytys EI OLE haitallista, jos murrosikä ei ole vielä alkanut, koska se näkyy päällepäin tai jos sitä tekee useammin kuin kerran viikossa	90,4	91,8	73,9	80,3
58. Itsetyydytys on hyvä tapa tutustua kehonsa seksuaalisiin reaktioihin	90,9	92,7	72,4	80,5

Oikeiden vastausten osuus tietotestissä 2000 ja 2006				
Väittämä	Työtöt		Pojat	
	2000	2006	2000	2006
59. Itsetyydytyksen harjoittaminen voi kuulua kaiken ikäisille	92,2	91,8	75,7	81,4
60. Ei pidä paikkaansa, että ongelmat erektion saamisessa tai ylläpitämisessä paljastaisivat aina, että poika ei pidä riittävästi tytöstä	38,3	37,7	27,1	28,5
61. Nuoret miehet pohtivat usein kuinka suureksi heidän peniksensä tulisi kasvaa. Kyetäkseen hedelmöittämään naisen peniksen pituudella ei ole väliä.	84,9	89,5	70,1	79,4
62. Nainen voi kokea orgasmin, eli seksuaalisen laukeamisen tuottaman hyvänolon tunteen yhdynnässä, jossa mies saa siemensyöksyn, emätinyhdynnässä, miehen hyväillessä hänen klitoristaan tai naisen hyväillessä itse itseään	91,2	92,6	77,4	81,8
63. Nainen kokee ensimmäisen orgasminsa yhdynnässä keskimäärin kahden–kolmen vuoden kuluttua ensimmäisestä yhdynnästä	8,9	6,8	7,0	7,1
64. Hyvänä rakastajana pidetään tavallisesti erityisesti kumppania, joka tuottaa sekä toiselle että itselleen nautintoa	95,3	95,5	83,1	85,7
65. 30 % nuorista ilmoittaa tutkimusten mukaan kokeneensa ensimmäisen yhdyntänsä ennen 16 ikävuottaan	32,8	36,0	33,4	32,8
66. Lasten väliset lääkäri- ja seksileikit, lasten itsetyydytys ja lasten väliset suukottelut ja halailut EIVÄT ole epätavallisia lapsuudessa	58,2	46,2	35,4	34,3
67. Sekä tyttö että poika voivat kokea ensimmäisen yhdyntänsä kivuliaana, noin puolet tytöistä ei koe lainkaan kipua ensimmäisessä yhdynnässä ja immenkalvoa voidaan tarvittaessa laajentaa etukäteen pienellä kirurgisella toimenpiteellä	48,6	48,7	28,2	30,0
68. Suomalaisilla tytöillä kuukautiset alkavat tavallisimmin 13-vuotiaana	80,5	81,1	58,8	60,6
69. Suomalaisilla pojilla siemensyöksyt alkavat tavallisimmin 14-vuotiaana	69,6	67,2	55,8	54,1
70. Monia nuoria kiinnostaisi kosketella ja hyväillä toista ihmistä, Sen voi tehdä, kun molemmat sitä haluavat	95,1	94,5	86,9	86,6

Oikeiden vastausten osuus tietotestissä 2000 ja 2006

Väittäjä	Työt		Pojat	
	2000	2006	2000	2006
71. Pedofiili on lapsista kiihotuksen saava aikuinen	93,7	92,9	87,9	87,7
72. Seksuaalista hyväksikäyttöä on, jos painostaa tai pakottaa toisen yhdyntään vastoin tämän tahtoa	73,2	57,1	67,9	62,4
73. Monoseksuaalisuus ei ole seksuaalinen suuntautuminen	86,3	90,4	73,5	83,4
74. Transvestiittimies pukeutuu naiseksi, koska naiseksi eläytyminen tuottaa hyvän olon	73,9	72,9	59,7	60,3
75. Suomen laissa on määritelty tietty ikäraja. Jos aikuinen on sukupuoliyhteydessä tätä nuoremman ihmisen kanssa, hän voi saada syytteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tämä ikäraja on 16 vuotta	41,9	73,1	37,8	56,1

LIITE 2

Seksuaaliterveystietokilpailun tietokysymysten vastausjakaumat sukupuolen mukaan vuodelta 2006

Oikeat vastausvaihtoehdot lihavoitu.

1. Murrosiän fyysiset muutokset tapahtuvat:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 viikossa tai kahdessa	0,5	1,2	0,8
2 teini-ikäisille eri ikäisinä	78,6	75,3	76,9
3 nopeasti tytöillä ja hitaasti pojilla	19,9	21,1	20,5
4 nopeasti pojilla ja hitaasti tytöillä	1,0	2,5	1,7
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 498	16 519	33 017

2. Seksuaaliasiat alkavat kiinnostaa murrosikäisiä enemmän, koska:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 heidän hormonituotantonsa muuttuu	53,3	62,3	57,8
2 joillakin heidän ystävistään on seksikokemuksia	1,1	1,8	1,4
3 media (TV, elokuvat, lehdet, internet, levyt) tyrkyttävät seksiä teini-ikäisille	1,6	3,8	2,7
4 kaikki edellä mainitut	44,0	32,0	38,1
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 555	16 535	33 090

3. Peniksen päässä sijaitsevaa terskaa peittää esinahka. Suositeltavaa hygienian kannalta on:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 käyttää sukupuolielinten päivittäisen pesun yhteydessä runsaasti saippuaa	3,7	6,2	5,0
2 välttää terskan kastumista	1,6	2,1	1,8
3 pestä myös terska siltä osin kuin se näkyy	29,8	17,0	23,4
4 vetää esinahka aivan taakse ja pestä penis kokonaan	64,9	74,7	69,8
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 414	16 482	32 896

4. Miehen sukupuolielimiin kuuluvat:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 penis	1,0	2,2	1,6
2 penis ja kivekset	39,8	45,7	42,8
3 penis, kivekset ja eturauhanen	38,4	38,7	38,6
4 penis, kivekset, eturauhanen ja kilpirauhanen	20,7	13,4	17,1
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 522	16 541	33 063

5. Naisen sukupuolielimiin kuuluvat	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 munasarja, munanjohdin ja kohtu	15,9	26,4	21,2
2 munasarja, kaksi munanjohdinta ja haima	2,4	6,6	4,5
3 kaksi munasarjaa, kaksi munanjohdinta ja kohtu	49,4	34,9	42,1
4 kaksi munasarjaa, kaksi munanjohdinta, kohtu ja virtsarakko	32,3	32,1	32,2
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 530	16 483	33 013

6. Sekä munasarjat että kivekset tuottavat:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 munasoluja	14,9	13,1	14,0
2 spermaa	5,0	12,2	8,6
3 hormoneja	71,5	60,3	65,9
4 siittiöitä	8,6	14,5	11,6
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 494	16 504	32 998

7. Siittiötä tuotetaan:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 siemenjohtimessa	18,9	9,3	14,1
2 peniksessä	3,9	3,8	3,8
3 kiveksissä	69,2	79,2	74,2
4 munasarjassa	8,0	7,8	7,9
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 548	16 586	33 134

8. Mikä seuraavista väittämistä on oikein?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 naisen munasarjat erittävät aina kaksi munasolua kuukaudessa	5,0	5,4	5,2
2 naisen munasarjat erittävät miljoonia munasoluja joka kuukausi	7,7	7,4	7,5
3 miehen kivekset tuottavat yhden tai kaksi siittiötä yhtä siemensyöksyä kohden	3,6	3,9	3,8
4 miehen kivekset tuottavat miljoonia siittiötä jokaiseen siemensyöksyyn	83,7	83,3	83,5
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 037	15 930	31 967

9. Pojan yölliset siemensyöksyt (märät unet) tarkoittavat, että hän on:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 sairastamassa seksuaalista tautia	0,4	1,2	0,8
2 fyysisesti täysin kehittynyt	3,9	6,3	5,1
3 kokemassa normaalia aikuiseksi kehittymisen vaihetta	95,2	91,3	93,3
4 erilainen kuin muut pojat	0,5	1,2	,9
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 608	16 592	33 200

10. Mikä seuraavista EI pidä paikkaansa? Murrosiässä pojat:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 alkavat tuottaa spermaa	5,8	4,2	5,0
2 heidän seksuaalinen halunsa lisääntyy	3,0	4,2	3,6
3 heidän peniksensä kasvaa	2,6	3,3	2,9
4 hormonieritys saa kuukausirytmien	88,6	88,4	88,5
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 407	16 415	32 822

11. Masturbointi tarkoittaa:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 itsensä seksuaalisesti kiihottavaa hyväilemistä	94,1	91,9	93,0
2 toisen seksuaalisesti kiihottavaa hyväilemistä	2,9	3,6	3,2
3 seksistä kieltäytymistä	1,4	2,1	1,7
4 seksuaalista hyväksikäyttöä	1,7	2,4	2,0
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 587	16 588	33 175

12. Poikien penis kovettuu ajoittain. Sellaista voi tapahtua:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 kun poika koskettelee sukupuolielimiään	9,3	9,2	9,3
2 tanssittaessa	0,4	1,5	1,0
3 silloin, kun poika katselee ihailien tyttöjä	8,6	12,3	10,4
4 kaikissa näissä tapauksissa	81,7	77,0	79,3
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 445	16 400	32 845

13. Mitä tarkoittaa kuukautiskierto?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 aikaa kahden täydenkuun välillä	0,8	3,3	2,0
2 kuukautisten siirtoa kahdella viikolla	1,1	7,7	4,4
3 aikaa kuukautisten alusta seuraavien kuukautisten alkuun	90,8	73,6	82,2
4 kuukautisvuodon kestoa päivinä	7,4	15,5	11,4
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 607	16 519	33 126

14. Kuukautistensa aikana tytöt:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 tulevat herkemmin raskaaksi	22,8	34,9	28,8
2 kokevat keskenmenon	1,0	3,3	2,1
3 ovat liian heikkoja osallistumaan urheiluharjoituksiin	4,0	11,6	7,8
4 ei mitään näistä	72,2	50,3	61,3
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 571	16 528	33 099

15. Tyttöjen emättimessä sijaitsee immenkalvo. Se on	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 kaikilla tytöillä koko emättimen aukon sulkeva vahva kalvo	8,8	12,3	10,6
2 emättimen aukon sulkeva kalvo, jonka puuttuminen osoittaa, että tyttö on ollut yhdynnässä	51,0	46,0	48,5
3 emättimen suulla oleva lima-kalvopoimu, jonka koko ja muoto vaihtelevat suuresti eri tytöillä	36,0	32,7	34,3
4 emättimen suulla oleva limakalvo, joka täytyy puhkaista ennen ensimmäistä yhdyntää	4,2	9,0	6,6
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 262	16 314	32 576

16. Tyttöjen rinnat kehittyvät suuremmiksi murrosiässä, ne	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 ovat usein vähän eri kokoiset vielä kehittyessään	10,7	14,2	12,5
2 ovat usein vähän arat ennen kuukautisia	2,5	6,9	4,7
3 alkavat kehittyä normaalisti 8–13 vuoden iässä	2,8	17,4	10,1
4 kaikki edellä mainitut pitävät paikkaansa	83,9	61,6	72,8
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 512	16 504	33 016

17. Rintojen koko	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 vaikuttaa merkittävästi siihen, voiko tyttö koskaan imettää	3,3	8,0	5,6
2 vaikuttaa merkittävästi siihen, voiko kukaan ihastua tyttöön	1,1	8,1	4,6
3 on yhteydessä tytön perimään ruumiinrakenteeseen	94,1	80,8	87,5
4 vaikuttaa merkittävästi siihen, saako tyttö aikuisena rintasyövän	1,4	3,2	2,3
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 619	16 528	33 147

18. Klitoris on:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 emättimen aukko	6,8	10,4	8,6
2 munasoluja kuljettava putki	2,7	4,2	3,5
3 tuntoherkkä kohouma häpyhuulien yläpuolella	80,0	73,9	77,0
4 sukupuolirauhanen	10,5	11,4	11,0
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 515	16 551	33 066

19. Valkovuoto on:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 merkki siitä, että tyttö on saanut sukupuolitaudin	0,4	3,3	1,9
2 merkki siitä, että tyttö ei ole huolehtinut intiimihygieniastaan	0,7	8,2	4,5
3 normaalia, kehitykseen kuuluvaa eritettä, jonka tulo alkaa yleensä jo ennen kuukautisten alkua	96,8	62,9	79,9
4 normaalia, kehitykseen kuuluvaa eritettä, jota yleensä tulee vain noin viitenä päivänä kuukaudessa	2,1	25,6	13,8
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 628	16 451	33 079

20. Valkovuotoa esiintyy:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 yleensä kaikilla tytöillä jossain määrin	30,0	45,7	37,9
2 yleensä erilaatuisena ja eri määriä kuukautiskierron eri päivinä	5,8	16,2	11,0
3 erityisen paljon tytön ollessa seksuaalisesti kiihottunut	2,6	11,9	7,2
4 kaikissa edellä mainituissa tilanteissa	61,6	26,2	43,9
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 473	16 384	32 857

21. Peniksen päästä purskahtava vaalea limamainen neste on:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 osa murrosiän normaalia hieneristyksestä	1,3	1,9	1,6
2 voidetta, joka helpottaa yhdyntöjä	1,4	2,8	2,1
3 siemennestettä	95,8	93,2	94,5
4 valkovuotoa	1,5	2,0	1,8
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 606	16 636	33 242

22. Mistä tietää, että tyttö voi tulla raskaaksi?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 tyttö kiinnostuu pojista ja aloittaa seurustelun	2,0	4,2	3,1
2 hän on täyttänyt 16 vuotta	1,1	4,0	2,5
3 hänen kuukautisensa ovat alkaneet	95,4	87,3	91,3
4 hänen rintansa ovat kehittyneet	1,5	4,6	3,0
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 605	16 583	33 188

23. Tulevatko kaikki halutessaan raskaaksi?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 kyllä, noin kuukauden kuluessa siitä kun ehkäisystä on luovuttu	6,8	11,7	9,3
2 kyllä, viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun ehkäisystä on luovuttu	2,1	5,8	4,0
3 kyllä, ainakin lapsettomuushoitojen avulla	6,1	8,2	7,1
4 eivät, vaikka yrittäisivät kuinka kauan	84,9	74,3	79,6
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 567	16 554	33 121

24. Missä kuukautiskierron vaiheessa nainen tulee helpommin raskaaksi?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 ennen kuukautisia	24,9	22,1	23,5
2 kuukautisten aikana	14,2	30,3	22,2
3 kuukautisten jälkeen	12,1	21,9	17,0
4 kuukautiskierron puolivälissä	48,9	25,7	37,3
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 529	16 519	33 048

25. Nainen EI voi tulla raskaaksi ollessaan	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 ensi kerran yhdynnässä	0,8	1,9	1,3
2 yhdynnässä kuukautisten aikana	2,4	3,0	2,7
3 yhdynnässä pystyasennossa	0,9	2,0	1,4
4 suuseksissä	95,9	93,2	94,5
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 569	16 566	33 135

26. Naisen mahdollisuutta tulla raskaaksi parantaa, jos:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 hän kokee yhdynnässä orgasmin	9,2	22,8	16,0
2 yhdyntä tapahtuu sopivassa kohtaa kuukautiskiertoa	84,4	65,8	75,1
3 yhdyntä kestää pitkään	5,7	8,7	7,2
4 mieskumppanilla on iso penis	0,7	2,7	1,7
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 570	16 544	33 114

27. Nainen tunnistaa tullessa raskaaksi	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 kun hän voi pahoin seuraavina päivinä yhdynnän jälkeen	25,1	25,3	25,2
2 kun emättimestä tulee outoa vuotoa	2,1	9,4	5,8
3 kun paino nousee viikon kuluttua yhdynnästä	5,7	15,7	10,7
4 ei mistään näistä	67,1	49,7	58,4
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 556	16 533	33 089

28. Kenen vastuulla on nuorten raskauden- ja sukupuolitautilien ehkäisy	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 vanhempien	1,8	4,9	3,3
2 tytön	0,7	2,5	1,6
3 pojan	0,7	2,5	1,6
4 yhteisesti sekä tytön että pojan	96,8	90,2	93,5
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 601	16 570	33 171

29. Ehkäisykeinoa valittaessa tulisi:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 valita taloudellisesti edullisin vaihtoehto	0,5	2,6	1,5
2 valita sama menetelmä, jota kaverit käyttävät	0,7	2,2	1,5
3 ottaa selvää kaikista menetelmistä ja valita itselleen parhaiten sopiva	96,7	90,2	93,5
4 käyttää menetelmää, joka on helpoimmin saatavilla	2,0	5,1	3,5
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 597	16 566	33 163

30. Mikä seuraavista ehkäisee varmimmin raskauden?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 e-pilleri	45,0	23,0	34,0
2 kondomi	49,3	66,0	57,7
3 keskeytetty yhdyntä	2,3	5,3	3,8
4 varmat päivät	3,4	5,7	4,5
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 304	16 311	32 615

31. Epäluotettavin keino ehkäistä on:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 kondomi	2,9	4,0	3,4
2 ehkäisytabletti	2,5	5,7	4,1
3 ehkäisykapseli	4,6	9,4	7,0
4 keskeytetty yhdyntä	90,1	81,0	85,5
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 603	16 597	33 200

32. Miten kondomi ehkäisee?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 siittiöt eivät pääse ulos peniksestä, koska kondomi puristaa sitä	5,0	3,9	4,5
2 siittiöt jäävät siemensyöksyn jälkeen kondomin sisälle	91,8	91,1	91,5
3 kondomin liukaste tappaa siittiöt	2,2	3,3	2,8
4 kondomi rikkoo munasolun	1,0	1,7	1,3
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 623	16 604	33 227

33. Mikä seuraavista on väärin kondomia käytettäessä:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 jätetään vähän tilaa kondomin päähän siemennestettä varten	12,1	7,4	9,7
2 käytetään uutta kondomia jokaisessa yhdynnässä	2,5	3,9	3,2
3 pidetään kondomista kiinni vedettäessä penistä emättimestä	4,9	3,7	4,3
4 asetetaan kondomi paikoilleen juuri ennen siemensyöksyä	80,5	85,0	82,8
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 459	16 465	32 924

34. Kondomeja voi ostaa:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 apteekista vain vanhempien luvalla	0,6	1,7	1,2
2 vapaasti apteekkeista, ruoka-kaupoista, kioskeista, huoltoasemilta	98,2	94,6	96,4
3 vain automaateista	0,7	1,8	1,2
4 vain seksikaupoista	0,5	1,9	1,2
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 650	16 612	33 262

35. Kondomien ostamisen alaikäraja on:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 13 vuotta	2,7	4,3	3,5
2 16 vuotta	4,5	6,0	5,3
3 18 vuotta	1,7	3,9	2,8
4 ikärajaa ei ole	91,0	85,8	88,4
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 613	16 580	33 193

36. Paljonko 5 kappaleen pakkaus tavallisia kondomeja maksaa ruokakaupassa keskimäärin?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 1 euro	5,0	5,6	5,3
2 2 euroa	27,6	22,4	25,0
3 4 euroa	58,5	61,2	59,9
4 8 euroa	8,9	10,8	9,8
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 561	16 574	33 135

37. Mihin pitää ottaa yhteyttä, jos haluaa e-pilleriehkäisyyn?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 kouluterveydenhoitajaan	2,1	4,8	3,5
2 lääkäriin	7,4	13,1	10,3
3 ehkäisyneuvolaan	3,9	8,8	6,3
4 mihin hyvänsä edellisistä	86,6	73,3	80,0
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 561	16 533	33 094

38. E-pillerit ehkäisevät raskauden:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 estämällä munasolun kypsymisen	64,5	54,0	59,2
2 estämällä siittiöiden pääsyn munasoluun	9,7	12,2	10,9
3 aiheuttamalla emättimen eritteen sitkistymisen	3,8	6,6	5,2
4 tuhoamalla siittiöt	22,0	27,2	24,6
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 529	16 532	33 061

39. Ehkäisytablettien:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 aiheuttavat lapsettomuutta	6,4	12,7	9,6
2 ovat hyvä ehkäisymenetelmä tupakoiville naisille	3,0	7,1	5,1
3 pahentavat yleensä kuukautiskipuja	4,2	11,1	7,7
4 niitä otetaan yhtäjaksoisesti 21–22 päivää, jotta ne olisivat tehokkaita	86,4	69,0	77,7
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 520	16 505	33 025

40. Ehkäisytablettien terveysvaikutuksena on:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 kuukautiskipujen lieveneminen	22,8	23,8	23,3
2 kuukautiskierron säännöllistyminen	13,7	19,7	16,7
3 verenhukan vähentyminen kuukautisten aikana	6,7	15,2	10,9
4 kaikki edellä mainitut	56,7	41,4	49,1
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 428	16 345	32 773

41. Jälkiehkäisy aloitetaan:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 viikon kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä	3,2	7,8	5,5
2 kahden viikon kuluttua kuukautisten poisjäännistä	2,3	6,2	4,2
3 niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään 72 tuntia suojaamattomasta yhdynnästä	84,8	72,4	78,6
4 viimeistään kuuden tunnin kuluttua suojaamattomasta yhdynnästä	9,7	13,6	11,6
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 582	16 547	33 129

42. Mitä pitää tehdä, jos epäilee olevansa ei-toivotusti raskaana?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 odottaa, että vielä seuraavatkin kuukautiset jäävät tulematta	1,4	2,4	1,9
2 tehdä raskaustesti	93,6	87,6	90,6
3 seurata, ilmeneekö raskausoireita	4,0	6,0	5,0
4 kirjoittaa lääkäripalstalle ja kysyä neuvoa	0,9	3,9	2,4
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 543	16 493	33 036

43. Kuka ensisijaisesti päättää alkaneen raskauden jatkamisesta?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 vanhemmat	3,6	7,0	5,3
2 lääkäri	2,9	5,8	4,4
3 tyttö	76,7	63,1	69,9
4 tyttö pojan suostumuksesta	16,8	24,1	20,4
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 550	16 490	33 040

44. Kun alle 16-vuotias tyttö Suomessa huomaa olevansa raskaana, hän useimmiten:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 tekee abortin	85,5	77,8	81,7
2 synnyttää ja pitää lapsen	6,2	7,8	7,0
3 synnyttää ja antaa lapsen adoptioon	6,1	9,4	7,7
4 synnyttää lapsen ja muuttaa lapsen isän kanssa yhteen	2,2	5,0	3,6
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 541	16 494	33 035

45. Suomessa suoritettu raskauden keskeytys:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 vähentää mahdollisuutta tulla myöhemmin raskaaksi	11,3	10,8	11,1
2 lisää kykyä tulla raskaaksi myöhemmin	1,2	3,8	2,5
3 ei vaikuta kykyyn tulla myöhemmin raskaaksi	66,3	62,4	64,4
4 voi aiheuttaa jatkossa keskenmenoja	21,2	22,9	22,1
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 486	16 465	32 951

46. Joskus ehkäisy voi unohtua, koska ei olla varauduttu yhdyntään. Tämän voi välttää:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 valitsemalla kumppanin, jonka arvelee huolehtivan ehkäisystä	3,1	5,4	4,3
2 kuljettamalla itse aina mukana kondomeja	87,7	83,4	85,5
3 aloittamalla e-pillereit heti yhdyntän jälkeen	6,4	6,4	6,4
4 keskeyttämällä yhdyntän ennen siemensyöksyä	2,7	4,8	3,8
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 484	16 466	32 950

47. Sukupuolitaudit tarttuvat:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 kun sukupuolielimiä koskettelee käsin	1,4	3,0	2,2
2 limakalvokontakteissa limakalvolta toiselle	84,2	80,5	82,4
3 suudeltaessa	1,3	4,2	2,8
4 kaikilla edellisillä tavoilla	13,1	12,3	12,7
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 562	16 506	33 068

48. Mistä tietää, että yhdyntäkumppanilta ei saa sukupuolitauteja?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 kun on tuntenut hänet jo usean kuukauden ajan	3,0	5,7	4,4
2 kun hänellä on kavereiden piirissä hyvä maine	0,7	2,5	1,6
3 kun hän kertoo, ettei hänellä ole sukupuolitauteja	15,7	17,8	16,8
4 ei mistään näistä	80,5	73,9	77,2
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 568	16 519	33 087

49. Mikä seuraavista sukupuolitauteiden ehkäisemiseen liittyvistä väittämistä on totta?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 yhdynnän jälkeinen virtsaaminen on hyvä ehkäisykeino sekä miehille että naisille	1,4	3,6	2,5
2 kierukka ehkäisee myös sukupuolitaudin saamiselta	6,7	7,2	6,9
3 kondomi on paras ehkäisyväline niille, joiden kumppani vaihtuu	89,3	84,7	87,0
4 jos kumppanilla ei ole mitään näkyviä oireita, hänellä ei myöskään ole sukupuolitauteja	2,7	4,5	3,6
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 506	16 444	32 950

50. Missä sukupuolitartunnan voi tutkituttaa ja saada sille hoitoa?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 koululääkärin vastaanotolla	0,7	2,3	1,5
2 terveyskeskuksessa	6,8	10,7	8,7
3 sukupuolitauteiden poliklinikalla	46,0	47,4	46,7
4 kaikissa edellämainituissa paikoissa	46,5	39,6	43,0
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 500	16 451	32 951

51. Sukupuolitaudin hoito onnistuu parhaiten	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 kun molemmat kumppanit hoidetaan samaan aikaan	43,6	36,8	40,2
2 kun vain oireita tunnistanut hakeutuu hoitoon	10,0	15,5	12,8
3 kun henkilö käyttää lääkitystä niin kauan että oireet häviävät	23,2	24,4	23,8
4 yhdynnöistä pidättäydytään oireiden ajaksi	23,2	23,3	23,3
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 401	16 424	32 825

52. Mitä tautia seuraavista EI voida täysin parantaa?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 tippuria	18,9	18,6	18,8
2 kuppaa	19,6	27,7	23,7
3 herpesä	37,1	28,4	32,7
4 trikomonasta	24,4	25,2	24,8
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 355	16 392	32 747

53. Kondylooma eli visvasyyliä on sukupuoliteitse tarttuva tauti joka	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 aiheuttaa joskus lapsettomuutta	12,6	14,0	13,3
2 on mahdollista parantaa antibiooteilla	21,8	23,5	22,6
3 voidaan todeta yksinkertaisella testillä sekä tytöiltä että pojilta	14,9	17,7	16,3
4 tekee joskus syylämäisiä muutoksia limakalvolle tai iholle	50,7	44,9	47,8
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 236	16 313	32 549

54. Voiko sukupuolitartunta olla täysin oireeton?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 ei koskaan	10,2	18,5	14,3
2 harvoin	43,8	45,9	44,8
3 usein	36,2	26,0	31,1
4 melkein aina	9,9	9,5	9,7
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 503	16 432	32 935

55. Mikä seuraavista on sukupuolitauti?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 endometrioosi	2,2	4,8	3,5
2 vaginismi	2,8	6,5	4,6
3 klamydia	93,4	85,1	89,2
4 myooma	1,6	3,7	2,6
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 448	16 388	32 836

56. Mikä seuraavista EI pidä paikkaansa? Masturbointi on:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 tapa vapauttaa seksuaalista energiaa	2,9	5,4	4,1
2 vaarallista terveydelle	77,0	65,9	71,4
3 itse tuotettua seksuaalista kiihottamista	16,1	22,3	19,2
4 suunnilleen yhtä yleistä pojilla ja tytöillä	4,0	6,4	5,2
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 441	16 371	32 812

57. Itsetyydytys on haitallista:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 jos murrosikä ei ole vielä alkanut	3,5	8,8	6,1
2 koska se näkyy päällepäin	1,5	4,5	3,0
3 jos sitä tekee useammin kuin kerran viikossa	3,3	6,5	4,9
4 ei missään näissä tapauksissa	91,8	80,3	86,0
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 510	16 460	32 970

58. Itsetyydytys on:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 helppoa, koska sitä voi tehdä koska ja missä vain	2,7	9,5	6,1
2 hyvä tapa tutustua kehonsa seksuaalisiin reaktioihin	92,7	80,5	86,7
3 nuoren seksuaaliselle kehittymiselle haitallista	2,6	4,5	3,6
4 suositeltavaa vain seksikumppanin puuttuessa	1,9	5,5	3,7
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 452	16 343	32 795

59. Itsetyydytyksen harjoittaminen voi kuulua	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 vain murrosikään	2,0	4,9	3,4
2 vain murrosikään ja yksineläville aikuisille	3,2	7,7	5,5
3 vain edelliselle ja naimisissa oleville aikuisille	3,0	6,0	4,5
4 kaiken ikäisille	91,8	81,4	86,6
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 495	16 414	32 909

60. Mikä EI pidä paikkaansa? Ongelmat erektion saamisessa tai ylläpitämisessä yhdynnässä:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 voivat johtua liiasta jännittämisestä	30,2	26,0	28,1
2 paljastavat aina, että poika ei pidä riittävästi tytöstä	37,7	28,5	33,1
3 voivat johtua verenkiertohäiriöstä	19,1	28,6	23,8
4 helpottuvat usein, jos tyttö hyväilee poikaa	13,0	17,0	15,0
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 255	16 231	32 486

61. Nuoret miehet pohtivat usein kuinka suureksi heidän peniksensä tulisi kasvaa. Kyetäkseen hedelmöittämään naisen peniksen tulisi olla jäykistyneenä:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 ainakin 10 cm	4,4	7,8	6,1
2 ainakin 15 cm	4,3	7,5	5,9
3 ainakin 20 cm	1,8	5,3	3,6
4 pituudella ei ole väliä	89,5	79,4	84,5
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 473	16 410	32 883

62. Nainen voi kokea orgasmin, eli seksuaalisen laukeamisen tuottaman hyvänolon tunteen:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 vain yhdynnässä, jossa mies saa siemensyöksyn	2,6	4,0	3,3
2 vain emätinyhdynnässä	2,1	7,1	4,6
3 vain miehen hyväillessä hänen klitoristaan	2,7	7,2	4,9
4 kaikilla edellisillä tavoilla sekä naisen hyväillessä itse itseään	92,6	81,8	87,2
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 442	16 373	32 815

63. Kuinka kauan naisella keskimäärin kestää ensimmäisestä yhdyntäkokeuksesta ensimmäiseen orgasmiin yhdynnässä? Orgasmi koetaan	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 yleensä jo ensimmäisessä yhdynnässä tai hyvin pian sen jälkeen	69,3	75,7	72,5
2 keskimäärin vuoden kuluessa ensimmäisestä yhdynnästä	21,6	14,3	18,0
3 keskimäärin kahden–kolmen vuoden kuluttua ensimmäisestä yhdynnästä	6,8	7,1	7,0
4 keskimäärin neljän–viiden vuoden kuluttua tai myöhemmin ensimmäisestä yhdynnästä	2,2	2,9	2,6
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 326	16 325	32 651

64. Hyvänä rakastajana pidetään tavallisesti erityisesti kumppania, joka:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 on nopea yhdynnässä	0,7	2,9	1,8
2 joka rakastelee mahdollisimman kauan	2,6	7,8	5,2
3 joka tuottaa sekä toiselle että itselleen nautintoa	95,5	85,7	90,6
4 joka valloittaa paljon naisia tai miehiä	1,3	3,6	2,4
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 435	16 335	32 770

65. Kuinka suuri osa nuorista ilmoittaa tutkimusten mukaan kokeneensa ensimmäisen yhdyntänsä ennen 16 ikävuottaan?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 15	36,4	40,9	38,7
2 30	36,0	32,8	34,4
3 45	20,1	16,7	18,4
4 60	7,5	9,6	8,5
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 336	16 237	32 573

66. Mikä seuraavista on lapsuudessa epätavallista?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 lasten väliset lääkäri- ja seksileikit	27,7	35,7	31,7
2 lasten itsetyydytys	23,8	25,2	24,5
3 lasten väliset suukottelut ja halailut	2,3	4,8	3,6
4 ei mikään edellisistä	46,2	34,3	40,2
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 273	16 204	32 477

67. Mikä seuraavista ensimmäistä yhdyntää koskevista väittämistä on oikein?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 sekä tyttö että poika voivat kokea ensimmäisen yhdyntänsä kivuliaana	36,8	46,1	41,4
2 noin puolet tytöistä ei koe lainkaan kipua ensimmäisessä yhdynnässä	8,7	14,2	11,4
3 immenkalvoa voidaan tarvittaessa laajentaa	5,9	9,7	7,8
4 kaikki edellä mainitut	48,7	30,0	39,4
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 301	16 220	32 521

68. Suomalaisilla tytöillä kuukautiset alkavat tavallisimmin:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 11-vuotiaana	13,4	25,1	19,2
2 13-vuotiaana	81,1	60,6	70,8
3 15-vuotiaana	4,9	11,7	8,3
4 17-vuotiaana	0,6	2,7	1,6
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 363	16 60	32 623

69. Suomalaisilla pojilla siemensyöksyt alkavat tavallisimmin:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 12-vuotiaana	18,0	33,3	25,6
2 14-vuotiaana	67,2	54,1	60,7
3 16-vuotiaana	13,8	9,5	11,7
4 18-vuotiaana	0,9	3,1	2,0
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 328	16 222	32 550

70. Monia nuoria kiinnostaisi kosketella ja hyväillä toista ihmistä. Sen voi tehdä, kun:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 itse sitä haluaa	2,2	4,2	3,2
2 toinen sitä haluaa	2,1	5,4	3,8
3 molemmat sitä haluavat	94,5	86,8	90,7
4 vanhemmat antavat siihen luvan	1,2	3,5	2,3
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 363	16 253	32 616

71. Mikä on pedofiili?	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 pornografian harrastaja	3,8	5,0	4,4
2 lasten surmaaja	1,8	4,7	3,2
3 lapsista kiihotuksen saava ihminen	92,9	87,7	90,3
4 kivusta nauttiva ihminen	1,5	2,6	2,1
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 372	16 279	32 651

72. Seksuaalista hyväksikäyttöä on:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 jos nuori on yhdynnässä alle 16 vuotiaan kanssa	4,1	8,8	6,4
2 jos painostaa tai pakottaa toisen yhdyntään vastoin tämän tahtoa	57,1	62,4	59,7
3 jos ottaa maksun seksuaalisesta kanssakäymisestä	3,2	7,3	5,2
4 kaikki edelliset	35,7	21,6	28,7
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 283	16 182	32 465

73. Mikä seuraavista EI ole seksuaalinen suuntautuminen	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 lesbous	2,4	4,0	3,2
2 biseksuaalisuus	3,2	7,2	5,2
3 monoseksuaalisuus	90,4	83,4	86,9
4 heteroseksuaalisuus	4,0	5,4	4,7
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 299	16 169	32 468

74. Transvestiittimies pukeutuu naiseksi, koska	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 hän toivoo sukupuolenkorjausleikkausta	9,5	10,3	9,9
2 hän haluaa ”iskeä” miehen	10,7	19,6	15,1
3 naiseksi eläytyminen tuottaa hyvän olon	72,9	60,3	66,6
4 tavoitteena on vain seksuaalinen kiihotus	6,9	9,9	8,4
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 166	16 048	32 214

75. Suomen laissa on määritelty tietty ikäraja. Jos aikuinen on sukupuoli-yhteydessä tätä nuoremman ihmisen kanssa, hän voi saada syytteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tämä ikäraja on:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 14 vuotta	2,9	5,9	4,4
2 15 vuotta	5,7	9,2	7,4
3 16 vuotta	73,1	56,1	64,6
4 18 vuotta	18,3	28,7	23,5
Yhteensä, %	100,0	100,0	100,0
N	16 249	16 095	32 344

76. Seksuaalista häirintää ja / tai seksuaalista hyväksikäyttöä on:	Tytöt	Pojat	Yhteensä
1 härskit puheet, huorittelu ja homottelu	2,1	6,9	4,5
2 painostaminen yhdyntään tai muuhun seksiin	7,1	15,2	11,1
3 kehon intiimien alueiden koskettelu tai kopelointi vasten tahtoa	9,1	19,5	14,3
4 kaikki edellä mainitut	81,8	58,4	70,1
Yhteensä	100,0	100,0	100,0
N	16 195	16 032	32 227